

Política de Prueba en Casa de Estreptococo

La FDA ha aprobado varias pruebas rápidas en casa de estreptococo para detectar una infección de garganta por estreptococo. Estas son disponibles para comprar en Amazon y se promocionan tener alta exactitud en mostrar si hay o no hay infección de garganta por estreptococo. Suena como una manera sencilla y rápida para los padres determinar por qué sus hijos tienen dolor de garganta, pero en realidad las cosas pueden ser complicadas. Recomendamos que su hijo venga a la clínica para una prueba de estreptococo. Aquí hay algunos puntos claves del porqué:

- Si no toman la muestra correctamente, la prueba puede mostrarse negativa (no hay amigdalitis) aun cuando estreptococo está presente.
- Una prueba de estreptococo un puede diagnosticar condiciones más serias o fatales que pueden afectar a los niños, tal como infecciones de tejidos profundos en el cuello (por ejemplo, un absceso en una amígdala, infección de la epiglotis, hinchazón al fondo de la garganta, etc.).
- Muchas personas son portadores de estreptococo, lo cual significa que tienen estreptococo viviendo en su garganta aun cuando no están enfermos. Así que una prueba positiva en un niño que tiene una causa viral para un dolor de garganta puede ser confusa.
- Tal vez más importante, en la clínica, siempre mandamos las muestras negativas para cultivar (ver en un laboratorio por varios días para ver si crece estreptococo). Esto es crítico porque en el caso que la prueba rápida es negativa, el cultivo proveerá una respuesta mucha más definitiva. Si estreptococo sigue sin tratamiento, hay potencial para complicaciones serias tal como nefritis (inflamación del riñón), enfermedad reumática del corazón (inflamación de una válvula del corazón), y más.
- Si la prueba rápida es negativa, hay la posibilidad de otras condiciones tratables que podríamos identificar en la clínica. Por ejemplo, algunas personas con influenza (gripe) que satisfacen algunos criterios específicos se pueden recibir Tamiflu como tratamiento si se comienza dentro de 48 hora del comienzo de síntomas..

Con esto en mente, no recetaremos antibióticos sin una muestra que tomamos en la clínica.



Salem Pediatric Clinic
La Clínica Pediátrica de Salem

2478 13th Street SE
Salem, Oregon 97302
503-362-2481 · Phone
503-371-7803 · Fax
SalemPediatricClinic.com